



SURDOSAGE EN LIDOCAÏNE INTRA-VEINEUSE du fait de la confusion entre la concentration et la quantité totale de lidocaïne totale

TROUBLES DU RYTHME - DECES



Agence Nationale de Sécurité du Médicament (2021) :

« Des erreurs d'administration liées à une lecture erronée de l'étiquetage entre les concentrations de principe actif (mg/L) et les quantités totale de principe actif (mg) pour le Xylocard® 50 mg/ml sont rapportées Ces confusions ont conduit à des surdosages massifs d'évolution parfois fatale. »



La prescription

Indications - Adultes

En prévention des douleurs post-opératoires, en anesthésie loco-régionale et en prévention des douleurs liées à l'injection de propofol par voie IV





- La méthode d'administration de la lidocaïne est fonction du type de procédure (IV, IM, SC ou péridurale)



Attention au risque de confusion entre les deux formes pharmaceutiques et aux modalités d'administrations

➔ Par conséquent, afin de prévenir ce risque d'erreur, une seule forme de lidocaïne iv va être conservée sur l'HFAR **soit la forme 200 mg/20mL.**



CONSEILS POUR LE PATIENT

L'administration de lidocaïne est exclusivement réalisée en milieu hospitalier, en situation d'urgence et pour résoudre un problème ponctuel. Ainsi si du Xylocard vous a été administré, il n'y a pas de raison de vous inquiéter.